PROPOSITIONS

N° 83.

DE

MÉDECINE ET DE CHIRURGIE;

THÈSE

Présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le 2 mai 1831, pour obtenir le grade de Docteur en médecine;

PAR ALEXANDRE FENIN, de Cambrai,

Bachelier ès-lettres; Bachelier ès-sciences des Facultés ès-lettres, ès-sciences de Paris; Pharmacien sous-Aide-Major à l'hôpital militaire d'instruction de Lille.

La femme est la partie nerveuse du genre humain, l'homme la partie musculaire.

HALLÉ.

A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE DIDOT LE JEUNE,

Imprimeur de la Faculté de Médecine, rue des Maçons-Sorbonne, n°. 13.

1830.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS.

Professeurs.

M. DUBOIS, Doyen.	Messieurs.
Anatomie	CRUVEILHIER.
Physiologie	.....
Chimie médicale	ORFILA.
Physique médicale	PELLETAN.
Histoire naturelle médicale	.....
Pharmacie	DEYEUX.
Hygiène	DES GENETTES, *Président.*
Pathologie chirurgicale	MARJOLIN, *Examinateur.* / CLOQUET.
Pathologie médicale	DUMÉRIL. / ANDRAL.
Opérations et appareils	RICHERAND, *Examinateur.*
Thérapeutique et matière médicale	ALIBERT.
Médecine légale	ADELON.
Accouchemens, maladies des femmes en couches et des enfans nouveau-nés	MOREAU.
Clinique médicale	LEROUX, *Suppléant.* / FOUQUIER. / ..... / CHOMEL.
Clinique chirurgicale	DUBOIS. / BOYER. / ROUX. / DUPUYTREN, *Examinateur.*
Clinique d'accouchemens	.....

Professeurs honoraires.

MM. DE JUSSIEU, LALLEMENT.

Agrégés en exercice.

Messieurs	Messieurs
Baudelocque.	Dubois.
Bayle.	Gerdy, *Examinateur.*
Bérard.	Gibert, *Examinateur.*
Blandin.	Hatin, *Suppléant.*
Bouillaud.	Lisfranc.
Bouvier.	Martin Solon.
Briquet.	Piorry.
Brongniart.	Rochoux.
Cottereau.	Sandras.
Dance.	Trousseau.
Devergie.	Velpeau.
Dubled.	

Par délibération du 9 décembre 1798, l'École a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs, qu'elle n'entend leur donner ni approbation, ni improbation.

A MA MÈRE

ET

A MA GRAND'MÈRE.

Amour filial.

A MON FRÈRE ET A MA SŒUR.

Amitié fraternelle.

A. FENIN.

A MA MÈRE

ET

A MA GRAND'MÈRE.

PROPOSITIONS

DE

MÉDECINE ET DE CHIRURGIE.

I.

De toutes les sciences dont l'ensemble constitue l'art de guérir, l'anatomie est la plus certaine et la plus usuelle, par conséquent la plus indispensable.

II.

De toutes les applications de l'anatomie aux êtres organisés, celle qui est faite à l'homme doit être le principal objet des méditations du médecin.

III.

Les saignées générales sont les moyens les plus puissans à opposer aux phlegmasies des organes parenchymateux.

Les saignées locales paraissent plus puissantes contre les phlegmasies des organes membraneux.

IV.

De deux quantités de sang retirées chez un même sujet, l'une par

les sangsues, l'autre par la saignée, la première débilite plus que la seconde.

V.

Dans les phlegmasies aiguës intenses, le succès que l'on peut attendre des émissions sanguines dépend de l'abondance et surtout de la rapidité avec laquelle elles sont pratiquées.

VI.

La saignée du pied est un moyen très-énergique dans les ophthalmies aiguës; peut-être n'est-il pas assez souvent opposé à cette affection.

VII.

Une révulsion long-temps prolongée sur le canal intestinal par le moyen des laxatifs, détermine souvent la guérison de maladies invétérées.

VIII.

Le rhumatisme aigu qui affecte plusieurs articulations est avantageusement combattu par les saignées générales. On doit préférer les sangsues et les topiques émolliens lorsqu'une seule articulation est malade.

IX.

Quand les tumeurs blanches nécessitent l'amputation des membres, on ne doit pratiquer cette opération qu'après s'être assuré de l'intégrité des fonctions des organes respiratoires.

X.

L'érysipèle ne réclame pas constamment le même mode de traitement.

XI.

Il est très-fréquent de voir survenir consécutivement des abcès en un point de la surface érysipélateuse.

XII.

Certains ulcères sont tellement liés à l'état actuel de l'économie, qu'il faut nécessairement modifier tout l'individu pour espérer quelque avantage de l'emploi des topiques.

XIII.

La puberté est surtout caractérisée chez la femme par l'aptitude à la fécondation et par l'établissement de la menstruation.

XIV.

La puberté est plus précoce chez les femmes d'une constitution très-nerveuse, chez celles qui habitent les grandes villes, et chez celles dont l'intelligence est plus développée.

XV.

Pour beaucoup de jeunes filles la puberté est une époque salutaire, qui les soustrait à des maladies de l'enfance dont on n'avait pu triompher par les traitemens les plus rationnels et les mieux suivis.

XVI.

Les préparations sulfureuses doivent faire la base de tout traitement antipsorique.

XVII.

En général, la syphilis cède mieux au traitement antiphlogistique qu'à tout autre.

XVIII.

Dans la gastrite par empoisonnement, évacuer le poison non encore absorbé, affaiblir ses propriétés délétères en le délayant, le neutraliser en le transformant en un corps nouveau peu nuisible.

XIX.

L'infanticide peut être volontaire ou involontaire.

XX.

Dans l'accouchement du fœtus par les fesses, accouchement que je regarde comme naturel, lorsque les fesses sont sorties de la vulve, si l'accouchement ne se termine pas dans deux ou trois minutes, il faut, aussitôt que les pulsations ne sont plus sensibles dans le cordon ombilical, en faire la section, et porter une sonde dans la bouche de l'enfant.

Tel est le sujet de mon sixième examen. Obligé de hâter ma réception, je n'ai fait que jeter en avant des idées auxquelles la discussion pourra procurer tout le développement convenable; peut-être, d'ailleurs, une thèse ne doit-elle pas donner davantage. Heureux si, par la manière dont j'aurai soutenu ces propositions, j'ai obtenu les honorables suffrages de mes juges, dont je m'efforcerai toujours de suivre les préceptes et les leçons !

FIN.

HIPPOCRATIS APHORISMI.

I.

Somnus, vigilia, utraque à modum excedentia, malum. *Sect.* 2, *aph.* 3.

II.

Qui sanguinem spumosum exspuunt, his ex pulmone talis rejectio fit. *Sect.* 5, *aph.* 31.

III.

Frigida velut nix, glacies, pectori inimica, tusses movent, sanguinis eruptiones ac catarrhos inducunt. *Ibid.*, *aph.* 24.

IV.

A sanguinis sputo, puris sputum, malum. *Sect.* 7, *aph.* 15.

V.

A pleuritide peripneumonia, malum. *Ibid.*, *aph.* 11.

VI.

A plagâ in caput, stupor aut delirium, malum. *Ibid.*, *aph.* 14.